



Les oiseaux rares en 2007 en Région Centre



Mouette de Sabine *Xema sabini*, juvénile, le Louroux, Indre-et-Loire, septembre 2007 (Sophie Reverdiau)

3^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional Centre



Les oiseaux rares en Région Centre en 2007

3^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional Centre

NIDAL ISSA & le CHR Centre

Le Comité d'Homologation Régional a pour but de récolter et d'archiver des données circonstanciées d'espèces rares et occasionnelles en Région Centre, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la rédaction et la publication d'un rapport, mis à disposition de l'ensemble de la communauté ornithologique tant régionale que nationale. Le CHR Centre collecte, centralise et transmet également les observations régionales d'espèces rares sur le plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Cela se matérialise chaque année par la publication d'un rapport annuel du CMR dans la revue d'ornithologie française *Ornithos* (ZUCCA & le CMR 2004, 2005, 2007).

Ce troisième rapport du Comité d'Homologation Régional pour la Région Centre (CHR Centre) couvre l'année 2007. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour l'année 2007 est de 199, auquel s'ajoutent 6 fiches concernant 2006 et une pour 2005. Le taux d'acceptation atteint 98,5%, un chiffre légèrement supérieur à celui de 2006 (97,2%) et 2005 (98%). La classification utilisée suit la liste des taxons observés en France métropolitaine préparée par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) et faisant office de référence en date du 30 juin 2007 (CAF 2007).

Il convient de rappeler que suite au déclassement par le Comité d'Homologation National (CHN) de 9 espèces, ces dernières ont été intégrées à la liste des migrateurs rares en France suivis par le CMR (ZUCCA & le CMR, 2007). Parmi elles, 7 ont déjà été observées en Région Centre et ont par conséquent été inscrites sur la liste des espèces soumises à homologation régionale (observations postérieures au 01 janvier 2006). Ces espèces sont : Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, Marouette poussin *Porzana parva*, Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, Pipit de Richard *Anthus richardi*, Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, Gobemouche nain *Ficedula parva*.

En 2007, le CHR Centre était composé des 9 membres suivants : Renaud Baeta, Jean-Yves Barnagaud, Pierre Cabard, Jean-Michel Chartendault, Nidal Issa (secrétaire), Alexandre Liger, Julien Présent, Julien Thurel et Tony Williams. A l'issue de la fin de l'année 2008 et au bout de 3 ans de fonctionnement, le CHR Centre procédera au renouvellement d'un tiers de ses membres. Les personnes souhaitant intégrer la structure sont invitées à en informer le plus rapidement son secrétaire par mail ou courrier.

Les fiches d'homologation, une fois remplies, sont à retourner à :
Nidal ISSA / Secrétaire du CHR Centre (nidalissa2002@yahoo.fr)
16, rue Azay-le-Rideau
37300 Joué-lès-Tours

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifiques.
2. Entre parenthèses, pour les espèces anciennement soumises à homologation nationale, le nombre de données et d'individus homologués depuis la création du CHN en 1981.
3. Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondant homologués depuis 2005 (date de création du CHR Centre), 2007 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondant homologués pour 2007.
3. La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique.
4. Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
5. Commune, lieu-dit, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
6. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
7. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
8. Date(s) d'observation.
9. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2003).
11. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis* (1/1 – 1/3)

Niche dans toute la zone boréale du Paléarctique, de la taïga et de la toundra, depuis le nord de la Péninsule Scandinave à l'ouest jusqu'au Golfe d'Anadyr, en Sibérie, à l'est. Hiverné en Asie Orientale et en Europe du Nord, Centrale et Occidentale, dans les zones humides et les terres agricoles.

Homologable en dehors d'Avord (Cher).

Cher - Tendron/Les Loges de l'Étang Neuf, 3 ind., sous-espèce *rossicus*, 16 décembre (P. Derrien).

Une seule donnée réalisée dans le Cher, département accueillant par ailleurs une petite population hivernante de quelques dizaines d'individus chaque année dans la zone militaire d'Avord.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (3/3 – 2/9)

Niche à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Il existe également des populations férales en forte augmentation sur quelques îles de la Baltique et aux Pays-Bas. L'aire d'hivernage s'étend de l'Irlande à l'Ecosse et de la Belgique au Danemark.

Cher - Avord, 8 ind., 11 février au 18 mars (J.-M. Chartendault, P. Derrien).

Indre-et-Loire - Parçay-sur-Vienne/Prézault, 16 avril (B. Griad).

2006

Indre-et-Loire - Pouzay/Les Grandes Varennes, 31 décembre (L. Le Gal, J. Présent).

Une petite troupe a stationné durant deux mois à Avord, rappelant le séjour de 14 individus au cours de l'hiver 2003-2004. Ce site est particulièrement attractif pour les ansériformes puisqu'il accueille plusieurs centaines d'Oies cendrées en hivernage chaque année.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (4/5 – 1/1)

Se reproduit dans l'Arctique circumpolaire et hiverné le long des côtes maritimes des zones tempérées d'Eurasie et d'Amérique du Nord. La sous-espèce *bernicla* niche en Sibérie occidentale jusqu'à la Péninsule de Taïmyr, hrota au Groenland, au Spitzberg et dans l'Arctique canadien, *nigricans* de l'île Victoria au Canada jusqu'au nord-est de la Sibérie.

Loiret - Meung-sur-Loire/Loire, phot., sous-espèce *bernicla*, 28 octobre (S. Branchereau, G. Chevrier).

2006

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, ad., sous-espèce *bernicla*, 12 décembre (T. Girard)

Année conforme à la moyenne pour cette espèce qui ne s'éloigne guère de ses couloirs de migration littoraux.



Fig. 1 : Bernache cravant *Branta bernicla*, Meung-sur-Loire (45) - 28 octobre 2007 (G. Chevrier).

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (24/50 – 15/28)

Niche en Espagne, en France, en Europe Centrale, en Anatolie, à l'est de la Mer Noire et la Mer Caspienne jusqu'en Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverné essentiellement dans les régions du Bassin Méditerranéen.

Homologable en dehors de l'Indre.

Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, 2 mâles et 1 fem., ad., 21 avril au 18 mai (J.-M. Chartendault, A. Liger, F. Besson).

Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, mâle ad., 24 décembre (C. Lartigau, P. Derrien & T. Jourdain).

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, fem. ad., phot., 20 au 29 janvier (J. Présent, L. Le Gal) ; Assay/Etang, mâle ad., phot., 27 mars (N. Issa, E. Sansault) ; Bossay-sur-Claise/Etang Perrière, mâle et fem., ad., 15 avril (J. Présent, M. Delagarde, A. Liger, E. Sansault) ; Assay/Etang, mâle, 04 novembre (B. Griard) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, fem. ad., 17 novembre (D. Sallé, P. Cabard, M. Delagarde) ; La Riche/La Potetterie, mâle et fem., ad., phot., 21 décembre au 10 janvier 2008 (J.-Y. Barnagaud, N. Issa) ; Montlouis-sur-Loire/Loire, fem., phot., 24 et 25 décembre (J. Présent).

Loiret - Bonnée/La Plaine aux Lièvres, mâle ad., phot., 11 au 18 mars (G. & G. Monchaux) ; Ouzouer-sur-Loire/La Plaine aux Lièvres, mâle ad., 29 mars (T. Joubert) ; Bonnée/La Grande Visure, mâle ad., 02 avril (C. Lartigau).

Loir-et-Cher - Lassay-sur-Croisne/Etang Bézard, 3 mâle et 1 fem, ad., 23 février (M. Mabillean) ; Millançay/Etang de Malzoné, 2 juv., 16 juin (M. Mabillean) ; Lassay-sur-Croisne/Etang Bézard, fem. avec 5 juv., phot., 24 et 30 juin (M. Mabillean, F. Pelsy & A. Callet).

2006

Indre-et-Loire - Assay/Etang, mâle ad., 25 et 26 mai (B. Griard).

Le nombre important d'observations noté pour la seconde année consécutive résulte probablement du développement et de la dissémination de la population de Brenne, qui comptait en 2007 une quarantaine de couples. Il convient également de mentionner la première reproduction de l'espèce dans le Loir-et-Cher, après celle du Cher en 2006.



Fig. 2 : Nette rousse mâle *Netta rufina*, La Riche (37) - 21 décembre 2007 (N. Issa).



Fig. 3 : Nette rousse femelle *Netta rufina*, La Riche (37) - 21 décembre 2007 (N. Issa).

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris* (7/7) (0/0 – 1/1)

Espèce néarctique nichant en Amérique du Nord, de la Colombie-Britannique à Terre Neuve, au nord jusqu'au Michigan et au Maine, au sud. Migrateur rare en Europe, principalement en hiver.

Indre - Lingé/Etang de Lérignon, mâle ad., phot., 18 février au 09 mars et Migné/Le Sault du 31/03 au 17/04 (L. & D. Sallé, J. Vèque *et al.*).

8^{ème} mention régionale et 7^{ème} pour l'Indre et la Brenne (observé en 1984 deux fois, 1985, 2000/2001, 2002 et 2003) où il s'avère être un hôte hivernal régulier dès lors que l'on s'attache à détailler durant l'hiver les grandes troupes de Fuligule morillon. Soumis à homologation nationale jusqu'en 2005, ce fuligule néarctique fait désormais l'objet d'une homologation régionale.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (13/14 – 5/5)

Niche des Balkans et de l'Europe Centrale jusqu'à l'Asie Centrale, occasionnellement plus à l'ouest.

Indre - Lingé/Etang de la Gabrière, mâle ad., 31 décembre (J. Pitois).

Indre-et-Loire - Assay/Etang, mâle ad., 08 au 17 novembre (J. Présent, C. Lelaure *et al.*).

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Marcilly, fem. ad., phot., 03 janvier (M. Mabileau) ; Millançay/Etang de Malzoné, mâle ad., phot., 19 juillet (M. Mabileau).

Cher - Avord, mâle ad., 03 mars (P. Derrien, F. Besson).

Année similaire à 2006 en nombre d'individus, répartis de manière homogène puisque 4 départements sur 6 ont accueilli l'espèce. L'observation anachronique d'un oiseau en période estivale en Sologne mérite d'être soulignée.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (4/7 – 2/3)

Dans le Paléarctique Occidental, niche en Islande, en Scandinavie et dans le nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Léna. Hiverné le long des côtes d'Europe du Nord et Occidentale, de l'Adriatique et de la Mer Noire.

Indre - Lingé/Etang de la Gabrière, mâle et fem. ad., phot., 25 mars au 18 avril (B. Delahaie, F. Desage, N. Issa, C. Mercier, J. Vèque *et al.*).

Loiret - Guilly/Bouteille, fem./juv., 31 décembre (B. & P. Delahaie).

Le stationnement d'un couple pendant près d'un mois au même moment qu'un Fuligule à tête noire *Aythya affinis*, a permis d'intéressantes comparaisons pour les observateurs ayant fait le déplacement.



Fig. 4 : Fuligule milouinan mâle adulte *Aythya marila*, Lingé (36) - mars 2007 (F. Desage).

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (0/0 – 3/8)

Niche dans les régions boréales et arctique du nord de l'Europe, Ecosse, Irlande, Scandinavie et du nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Olenek. Hiverné le long des côtes atlantiques du nord de la Scandinavie à la Mauritanie.

Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, 1 mâle H1 et 3 fem./juv., phot., 22 décembre au 21 février 2008 (M. Mabileau, F. Pelsy *et al.*).

Indre - Sainte-Sévère-sur-Indre/Etang de Rongères, fem. ad./juv., phot., 30 novembre (T. Chatton, P. Boyer).

Loiret - Briare/Sablère de Beauget, 1 mâle et 2 fem. immatures, phot., 11 mars (C. Lartigau, J. Dumont & Groupe Ornithologique Loiret Nature Environnement).

Belle série de données après plusieurs années vierges d'observations.



Fig. 5 : Macreuse brune *Melanitta fusca*, mâle immature, Argent-sur-Sauldre/Cerdon (18/45) - février 2008 (F. Pelsy).

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (4/8 – 3/3)

Niche dans les zones boréales et océaniques d'Europe du Nord, d'Islande, de Grande-Bretagne, de Scandinavie, à l'est jusqu'au nord de la Sibérie. Hivernent le long des côtes d'Europe atlantique, de Méditerranée Orientale, de la Mer Noire jusqu'à la Mer Caspienne.

Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, mâle ad., phot., 01 au 03 décembre (M. Lacroix, G. Monchaux, P. Derrien *et al.*).

Loiret - Guilly/Bouteille, fem. ad., 24 novembre au 23 décembre (B. Delahaie, L. Sallé *et al.*) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Ile des Mahis, fem. ad. 23 décembre (C. Lartigau).

Un petit passage s'est manifesté en fin d'année dans la partie est avec 3 individus dans le Loiret, alors que son occurrence régionale se situe plutôt à l'ouest.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (4/4 – 1/1)

Répartition néarctique. Introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement. En France, niche notamment sur le Lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique et en Mayenne.

Indre - Lingé/Etang du Gabriau, fem. ad., phot., 26 juillet (F. Desage).

L'unique mention est classiquement réalisée sur les étangs de la Brenne connus pour leurs importantes concentrations en anatidés plongeur.



Fig. 6 : Erismaiture rousse femelle *Oxyura jamaicensis*, Lingé (36) - 26 juillet 2007 (F. Desage).

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (3/3 – 5/5)

Niche dans les fjords, les lacs et étangs des zones boréales et subarctiques jusqu'au 83° Nord. En Europe, la zone de reproduction s'étend de la Scandinavie à la Sibérie, l'Islande et l'Ecosse. Hivernent le long des côtes et estuaires de l'Europe occidentale et du sud, à l'est jusqu'à la Mer Noire.

Indre - Rosnay/Etang du Sault, juv., phot., 08 et 09 novembre (C. Mercier) ; Migné/Grand Etang de Migné, ad., 19 novembre (P. Boyer).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., phot., 07 novembre (N. Issa, L. Sallé, S. Reverdiau) ; Saint-Avertin/Lac des Peupleraies et Cher, juv., phot., 10 au 15 décembre (J. Présent *et al.*).

Loir-et-Cher - Chouzy-sur-Cisse/Carrière de Chouzy, juv., phot., 28 novembre (F. Pelsy).

L'apparition des plongeurs se situe classiquement lors du passage postnuptial en novembre-décembre, comme l'atteste à nouveau l'ensemble des observations réalisées cette année. Avec 5 oiseaux, 2007 se place au dessus de la moyenne annuelle.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (5/5 – 1/1)

Zone de répartition néarctique. Dans le Paléarctique, niche uniquement en Islande et sur l'île de Bear. Hiverne le long des côtes du nord de la Scandinavie, de Grande-Bretagne, la Mer du Nord, au sud jusqu'au Portugal.

Indre-et-Loire - Parçay-sur-Vienne/La Prée, 1^{er} hiver, 20 janvier (J. Présent, L. Le Gal).

L'individu observé en début d'année s'inscrit dans le prolongement du petit afflux régional (4 oiseaux) intervenu en décembre 2006.

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (5/5 – 1/1)

Dans le Paléarctique occidentale, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hiverne principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la Mer Noire et de l'Adriatique.

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Favelle, ad., phot., 05 mai (M. Mabileau).

L'observation en mai d'un oiseau en plumage nuptial tranche avec le pattern d'apparition régional, l'espèce étant plutôt notée lors de la période hivernale. Cette unique mention pour 2007 est conforme au statut constaté en Région Centre depuis le suivi entrepris par le CMR en 2001.

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (5/5 – 1/1)

Distribution holarctique. Niche en Islande, Ecosse, Fennoscandie, dans les Pays Baltes et en Russie. Hiverne le long des côtes françaises de l'Atlantique, les Mers du Nord, Baltique et Adriatique, à l'est jusqu'à la Mer Noire.

Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, 01 au 03 décembre (M. Lacroix *et al.*).

Après les 4 individus observés en 2006, retour à une année normale pour cet hivernant littoral relativement rare à l'intérieur des terres.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (8/11 – 2/4)

Espèce paléarctique nichant en roselière dans l'ensemble de l'Europe, où les bastions se situent essentiellement à l'Est, en Pologne, Ukraine et Russie. Les populations d'Europe Occidentale sont partiellement migratrices, celles d'Europe Orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le Bassin Méditerranéen et en Afrique.

Homologable en dehors de l'Indre.

Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, ad., phot., 16 décembre (J. Martinez, C. Maurer *et al.*) et 2 ad., 24 décembre (C. Lartigau, P. Derrien, T. Jourdain).

Loiret - Marcilly-en-Villette, ad. et imm., 04 au 25 novembre (C. Lartigau *et al.*);

Le faible nombre d'oiseaux notés dans les départements limitrophes de l'Indre est probablement corrélé à la chute de la population nicheuse de Brenne depuis plusieurs années.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (3/3 – 2/2)

Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord.

Loiret - Bou/Chemin de la Deleu, ad., phot., 01 juillet (M.-F. Brigot & C. Mesnard).

Loir-et-Cher - Chaumont-sur-Loire/Loire, juv., phot., 16 septembre (J.-C. Duval).

En dehors des 4 couples « nicheur probable » de la base militaire de Rosnay dans l'Indre, le Crabier fournit deux observations en estivage et en migration postnuptiale à une date assez tardive.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (0/0 – 1/1)

Dans le Paléarctique Occidentale, niche principalement dans le sud de l'Europe de la mer Noire à l'Espagne. Migrateur rare et nicheur localisé en France sur la façade méditerranéenne. Migrateur occasionnel ailleurs.

Indre-et-Loire - Assay/Etang, 15 octobre (L. Sallé, E. Sansault).

Belle mais brève observation de cette espèce méditerranéenne et orientale dont l'occurrence en dehors de ses axes migratoires est très rare.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (16/25 – 6/14)

Dans le Paléarctique, niche au nord du 55° N, en France, Espagne, Pays-Bas, en Europe orientale, à l'est jusqu'à la Mer Caspienne. Les populations européennes hivernent sur le pourtour méditerranéen et au nord de l'Afrique tropicale.

Indre - Niherne/Etang des Loges, 2 juv., 10 octobre (M. Prévost); Velles/Etang de Madagascar, 6 ind. (3 juv., 1 ad., 2 indet.), 12 octobre (T. Chatton, P. Boyer).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad. et imm., 28 mai (J. Présent); Tours/A10, 27 septembre (J. Présent); Parçay-sur-Vienne/Les Bouctonnères, 2 ad., 06 octobre (B. Griad); Saint-Genouph/La Gaudinière, juv., 30 octobre (J. Présent).

Année similaire à 2006 avec une quinzaine d'individus, notés préférentiellement lors du passage postnuptial sur les étangs de l'Indre et en Touraine. L'espèce demeure très rare ailleurs.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (6/6 – 2/1)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Toujours lié à la proximité des milieux aquatiques.

Indre - Niherne/Etang des Loges, ad., 05 février (F. Desage).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 2^{ème} année, phot., 01 au 07 décembre (T. Bousserau, N. Issa, E. Sansault, J.-M. Thibault, P. Cabard *et al.*)

Année assez pauvre avec le signalement d'un seul hivernant en Brenne, l'adulte revenant de l'étang des Loges. En Indre-et-Loire la dernière mention remontait à 1993. Cette observation constitue une première pour le Lac de Rillé où l'espèce était attendue depuis longtemps...

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (1/1 – 1/1)

La sous-espèce nominale niche en Europe entre 35° et 45°N, dans l'extrême nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et dans l'Ouest de l'Asie. Espèce erratique, occasionnelle en France en dehors des zones de réintroduction.

Cher - Bouzais et Orval/C.E.T., ad., vidéo, 25 et 26 mai (J.-M. Chartendault).

Une nouvelle observation est réalisée dans le Cher après celle de 2006, conséquence de l'afflux qui s'est reproduit au nord de l'aire de répartition de l'espèce. Cet individu a en outre été filmé par les caméras de surveillance du C.E.T. d'Orval, fournissant un document photographique de l'oiseau.

AIGLE DE BONELLI *Hieraetus pennatus* (2/2 – 2/2)

Dans le Paléarctique, niche en Afrique du Nord, en Europe méditerranéenne au Moyen-Orient, dans la péninsule indienne jusqu'aux contreforts de l'Himalaya, et dans le sud de la Chine. Sédentaire et erratique.

Indre-et-Loire - Channay-sur-Lathan, 2^{ème} année, phot., 04 février (S. Reverdiau).

Loiret - Vannes-sur-Cosson, 2^{ème} année, capt., phot., 23 juin (ONCFS *vide* J. Thurel).

2006

Cher - Bourges, 2^{ème} année, 01 octobre (J.-M. Chartendault).

Depuis 2005, la Région Centre aura de manière exceptionnelle accueillie 4 individus différents dans 3 départements. Toutes ces observations concernent classiquement des oiseaux immatures, dont le niveau d'erratismes est important. L'individu capturé dans un piège à corvidés à Vannes-sur-Cosson, avait été bagué poussin dans le Gard en 2006. Par ailleurs, l'oiseau de Channay-sur-Lathan, également bagué, fournit la première mention pour l'Indre-et-Loire.



Fig. 7 : Aigle de Bonelli *Hieraetus pennatus*, 2^{ème} année, Channay-sur-Lathan (37) - 04 février 2007 (S. Reverdiau).

Fig. 8 : Aigle de Bonelli *Hieraetus pennatus*, 2^{ème} année, Vannes-sur-Cosson (45) - 23 juin 2007 (ONCFS).

FAUCON KOBZ Falco vespertinus (0/0 – 2/2)

Niche en Europe depuis la Hongrie, à l'est jusque fleuve Lena, en Russie.

Cher - Bourges/Centre Ville, mâle ad., 19 mai (F. Besson & J.-M. Chartendault).

Eure-et-Loir - Ecrosnes/Hameau de Giroudet, mâle ad., 29 avril (L. Chevallier & S. Chevallier-Brierre).

Après plusieurs années blanches, ce faucon oriental est à nouveau observé, comme à l'accoutumée, lors du passage prénuptial en avril-mai dans la partie est de la région.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (2/3 – 3/4)

Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d'Eurasie. Hiverné en Afrique sub-saharienne.

Indre - Saint-Michel-en-Brenne/Etang Cistude, ad. et juv., phot., 13 septembre (T. Williams *et al.*).

Indre-et-Loire - Saint-Genouph/Ile aux Bœufs, 25 mars (J. Présent).

Loir-et-Cher - Chémery/Etang du Gué, ad., phot., 23 août (A. Pollet).

Bonne année avec 4 individus contactés lors du passage prénuptial et postnuptial. Les oiseaux de Brenne pourraient se reporter à des nicheurs.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (5/6) (1/1 – 1/1)

Niche de façon dispersée en Europe de l'Ouest, puis de façon plus continue jusqu'à l'Asie centrale et au nord-ouest de la Chine. Les populations européennes hivernent en Afrique subsaharienne. Migrateur rare et nicheur occasionnel en France.

Indre - Saint-Michel-en-Brenne/Etang Miclos, mâle ad., phot., 21 au 25 juin (J. Vèque, E. Male-Malherbe, J. Deberge).

L'observation d'un mâle en période de reproduction est encourageante. Nicheur très commun en Brenne au XIX^{ème} et au début du XX^{ème} siècle (Martin R. & Rollinat R., 1894), la nidification de l'espèce est devenue occasionnelle depuis.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus* (8/15 – 2/3)

Niche le long des côtes d'Europe Occidentale et du Nord, en Russie à l'est jusqu'en Sibérie. Migrateur partiel, hiverné sur le littoral d'Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord, au sud jusqu'au Golfe de Guinée.

Indre - Niherne/Etang des Loges, ad., 08 mars (M. Prévost).

Indre-et-Loire - Berthenay/Loire, 2 ad., phot., 27 avril (M. Tellia).

Petite année avec seulement 3 individus.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (1/1 – 4/4)

Niche de l'Europe de l'Ouest et du nord-ouest de l'Afrique, à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale jusqu'au nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient russe. En France, niche le long des côtes de la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Occasionnel à l'intérieur des terres.

Cher - Couargues/Amont du pont, mâle ad., phot., 08 et 09 mai (P. Derrien, S. Merle *et al.*) ; Avord, fem. ad., phot., 27 mai (P. Derrien, J.-M. Chartendault).

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, 24 août (J. Présent, L. Le Gal).

Loiret - Saint-Denis-en-Val/La Haute Ile, 10 au 12 avril (T. Joubert).

L'observation de 4 oiseaux dans 3 départements est tout à fait remarquable compte tenu de la rareté de l'espèce à l'intérieur des terres.



Fig. 9 : Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*, femelle, Avord (18) - 27 mai 2007 (P. Derrien).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (14/73 – 6/29)

Niche en Ecosse et dans les Pyrénées, puis de la Scandinavie au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la Sibérie Orientale. Hiverné des contreforts de l'Atlas marocain à l'Iran en passant par tout le Maghreb. Egalement noté en petit nombre en Andalousie, en Grèce, en Sicile et dans le sud de l'Italie, en Sardaigne, en Crète et à Chypre, parfois irrégulièrement.

Cher - Avord/Guilly, 3 ad., phot., 26 août (P. Derrien, J.-M. Chartendault *et al.*).

Eure-et-Loir - Bazoche-en-Dunois, 2 fem. ad., phot., 01 mai (T. & C. Cense).

Indre - Paudy/La Ronde, 2 ad., 04 et 05/09 (J. Eldin).

Indre-et-Loire - Tauxigny/Les Epinettes, 19 ind. (11 ad. et 8 juv.), phot., 24 et 25 août (J. Présent, L. Le Gal, J.-M. Thibault, D. Sallé) ; Dolus-le-sec/Les Maisons rouges, 2 juv., phot., 03 septembre (J.-M. Thibault) ; Cigogné/Les Terrages, juv., phot., 21 septembre (J. Présent, L. Le Gal).

2006

Loir-et-Cher - Nouray, 2 ind., 16 septembre (J. Niel, V. Lambert)

Les prospections en Beauce n'ont malheureusement pas permis de localiser de belles troupes comme les années précédentes. L'observation d'un rassemblement record pour l'Indre-et-Loire mérite par ailleurs d'être signalée.



Fig. 10 : Pluvier guignard *Charadrius morinellus*, juvéniles, Dolus-le-sec (37) - 03 septembre 2007 (J.-M. Thibault).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (15/23 – 8/9)

Niche dans toute la zone boréale et subarctique d'Eurasie, jusqu'au Détroit de Béring à l'est de la Sibérie. La quasi-totalité des oiseaux européens rejoignent le sud du Sahara et hivernent du Sahel au Golfe de Guinée et au Kenya.

Cher - Lignéres/Etang de la Chelouze, ad., phot., 28 avril (F. Besson, P. Derrien) ; Couargues/amont du pont, ad., phot., 09 au 11 mai (S. Merle, P. Derrien *et al.*).

Indre - Lingé, juv., phot., 13 au 17 septembre (A. Rougeron *et al.*).

Indre-et-Loire - Saint-Genouph/La Gaudinière, ad., 28 avril (B. Griard) ; La-Chapelle-sur-Loire/Port d'Ablevois, ad., 13 mai (J. Présent) ; La-Chapelle-sur-Loire/Loire, 2 ad., 17 mai (J. Présent *et al.*) ; La-Chapelle-aux-Naux/Loire, ad., 05 et 06 août (B. Griard, J.-M. Feuillet, J. Présent).

Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, ad., phot., 21 juillet (B. et P. Delahaie).

Année identique à 2006 en termes de données et d'individus. La Loire accueille comme à l'accoutumée une proportion importante des oiseaux et la répartition homogène des observations sur l'ensemble du territoire régional est comparable au pattern d'apparition constaté les années précédentes. Dans le Loiret, l'espèce est notée de manière annuelle sur les bassins de décantation de Pithiviers-le-Vieil.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (13/15) (1/1 – 1/1)

Niche dans l'Arctique nord-américain et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Migrateur rare mais régulier en Europe, noté en petit nombre en France, essentiellement en automne.

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang de Beaulieu, juv., phot., 14 octobre (J. Présent, B. Delahaie, Q. Giraudon).

Nouvelle observation de ce limicole américain après celle de 2006 dans le Loiret et 15^{ème} mention régionale (1 en Eure-et-Loir, 4 dans l'Indre, 6 en Indre-et-Loire, 4 dans le Loiret). La confiance extrême des limicoles néarctiques vis-à-vis de l'homme demeure toujours aussi déconcertante.



Fig. 11 et 12 : Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, juvénile, Le Louroux (37) - 14 octobre 2007 (J. Présent).

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (9/12 – 6/14)

Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la Sibérie orientale. Hiverné en Europe de l'Ouest et du Sud, en Afrique du Nord, au nord des zones afro tropicales, au Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Vietnam.

Homologable en dehors de l'Indre-et-Loire.

Cher - Avord, 07 avril (P. Derrien) ; Avord, 2 ind., 15 avril (P. Derrien).

Indre - Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, 25 février (E. Sansault, B. Delahaie, N. Issa, A. Liger, J. Présent) ; Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, 31 mars (N. Issa, A. Liger, E. Sansault) ; Lys-Saint-Georges/Etang, 8 ind. max., 08 et 09 avril (A. Rougeron, T. Joubert).

Loiret - Saint-Père-sur-Loire/Les Coudreaux, 14 avril (J. Thurel).

Les prospections ciblées entreprises dans le Cher et l'Indre ont permis la collecte de quelques données mais l'espèce est encore largement sous-prospectée ailleurs.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (2/2 – 8/8)

Niche du nord de la Scandinavie et de la Russie d'Europe jusqu'à l'Ienisseï. En France, migrateur et hivernant régulier le long du littoral atlantique et de la Manche, rare à l'intérieur des terres..

Cher - Couargues/amont du pont, mâle ad., phot., 11 et 12 mai (J.-M. Chartendraul, S. Merle, P. Derrien, N. Dufresne, D. Migneau) ; Avord, 2^{ème} année, phot., 12 mai (P. Derrien, J.-M. Chartendraul, F. Besson, S. Merle).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 2 juv., 09 et 10 septembre (B. Griad, J.-M. Feuillet *et al.*) ; Nouans-les-Fontaines/Neuillé, 2 juv., 23 septembre (J. Présent, L. Le Gal) ; Tours/Loire, juv., 03 octobre (D. Thierry).

Loir-et-Cher - Chémery/Etang du Gué, juv., phot., 13 septembre (A. Pollet).

Le nombre de données est nettement supérieur à celui des années précédentes et concerne des adultes et des immatures en mai, mais exclusivement des juvéniles lors du passage postnuptial.



Fig. 13 : Barge rousse *Limosa lapponica*, mâle adulte, Couargues (18) - 11 mai 2007 (S. Merle).



Fig. 14 : Barge rousse *Limosa lapponica*, 2^{ème} année, Avord (18) - 12 mai 2007 (P. Derrien).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (11/27 – 11/30)

Niche dans les zones boréales, arctiques et subarctiques d'Islande, du nord des Iles Britanniques, de la Scandinavie à l'ouest de la Sibérie, jusqu'à la vallée de l'Inisseï et à Taïmyr. La sous-espèce type hiverne dans les régions afro tropicales, sur les côtes de l'ouest de l'Océan Indien et occasionnellement en Europe.

Cher - Couargues/Pont, ad., 08 mai (P. Derrien, S. Merle).

Indre - Rosnay, ad., 04 avril (J. Pitois) ; Mézières-en-Brenne, ad., phot., 11 août (G. Chevrier).

Indre-et-Loire - Lublé, ad., phot., 01 mai (S. Reverdiau) ; Le Louroux/Etang, 24 août (J. Présent, L. Le Gal)

Loiret - Combleux/La Patache, 2 ind., 18 avril (J.-L. Senotier & C. Gauberville) ; Sennely/Étang des Berthiers, 17 mai (J. Martinez) ; Bouzy-la-Forêt et Bray-en-Val/Route de la Verrerie, 3 ind., 03 juillet (C. Lartigau *et al.*) ; Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand Rue, 17 ind., 12 août (S. Rolland) ; Saint-Péravy-la-Colombe/Station de compostage, 17 septembre (C. Lartigau, P. Rossler) ; Olivet/La Maladrerie, 05 novembre (C. Lartigau).

Avec 30 individus contactés, dont un groupe de 17 dans le Loiret, 2007 constitue une année record. Le Corlieu s'avère être un hôte régulier et peu commun aux deux migrations dans l'ensemble de la région.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (1/1 – 2/2)

Niche des zones steppiques aux régions boréales de la Biélorussie à l'Asie Centrale et hiverne au sud du Sahara, dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est.

Cher - Avord, ad., phot., 14 avril (P. Derrien).

Loiret - Saint-Denis-en-Val/Melleray, ad., phot., 06 mai (S. Branchereau).

L'observation de deux oiseaux en 2007 intervient après une année blanche en 2006 et la mention d'un seul individu en 2004 et 2005, confirmant son caractère occasionnel et non annuel à l'échelle régionale. Bien qu'il soit plus régulier dans la partie occidentale du pays en automne, la plupart des données en Région Centre sont printanières, provenant probablement d'un décalage vert l'ouest des voies de migration orientales de l'espèce.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius* (1/1 – 1/1)

Niche dans l'Arctique au-delà de 70° de latitude Nord. Quelques dizaines de couples nichent en Islande. Migre quasi exclusivement en pleine mer. Hiverne également en mer, dans l'Atlantique, principalement dans les zones d'upwelling d'Afrique de l'Ouest, au sud du tropique du Cancer et à l'ouest de l'Amérique du Sud.

Indre-et-Loire - Chargé/Loire, ad., 10 novembre (P. Cabard, L. Le Gal).

Nouvelle observation après 2005 de ce migrateur pélagique et littoral, à une date assez classique.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus* (0/0 – 6/6)

Niche dans la toundra de la Russie, de l'Alaska et du Canada. Migrateur pélagique en Europe Occidentale, occasionnel à l'intérieur des terres.

Indre - Luant/Etang Duris, juv., phot., 16 novembre (T. Chatton, P. Boyer) ; Migné/Etang du Sault, juv., 09 au 26 novembre (J. Thurel, B. Petit, G. Monchaux, J. Vèque *et al.*) ; Rosnay/Etang du Blizon, juv., 03 décembre puis Lingé/Le Gabriau et La Gabrière, 08 décembre (P. Boyer *et al.*).

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, juv., phot., vidéo, 13 au 15 novembre (J. Présent, R. Baeta, N. Issa, E. Sansault *et al.*).

Loiret - Jargeau/Pont de la Loire, juv., phot., 10 novembre (J. Thurel *et al.*) ; Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand Rue, juv., 11 novembre (J. Thurel, C. Maurer, J. Martinez, G. Monchaux).

L'afflux national qui s'est produit en novembre à l'intérieur des terres a touché la Région Centre de manière significative puisqu'au moins 6 oiseaux ont été contactés dont 3 sur les étangs de la Brenne. La totalité des observations concernait des juvéniles.



Fig. 15 : Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*, juvénile, Jargeau (45) - 10 novembre 2007 (J. Thurel).



Fig. 16 : Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*, juvénile, Le Louroux (37) - 13 novembre 2007 (N. Issa).

MOUETTE DE SABINE *Xema sabini* (0/0 – 1/1)

Niche en Alaska, dans l'Arctique canadien, au Groenland, occasionnellement au Spiteberg et en Sibérie. Migrateur pélagique en Europe Atlantique, occasionnel à l'intérieur des terres, souvent à la faveur des tempêtes.

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, juv., phot., 14 au 19 septembre (J. Présent, S. Reverdiau *et al.*).

L'unique mention tourangelle datait de 1970. Ce migrateur pélagique demeure très occasionnel à l'intérieur des terres où ses apparitions sont généralement corrélées à des tempêtes automnales.



Fig. 17 : Mouette de Sabine *Xema sabini*, juvénile, Le Louroux (37) - septembre 2007 (J.-M. Thibault).

GOELAND MARIN *Larus marinus* (0/0 – 3/3)

En Europe, niche sur les côtes de l'Irlande et l'ouest de la France à la péninsule de Kola à l'est, ponctuellement au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Hivernant et migrateur occasionnel à l'intérieur des terres.

Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 2^{ème} hiver, 06 novembre (N. Issa) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 15 au 24 novembre (N. Issa, L. Sallé, R. Baeta *et al.*) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 22 novembre au 15 décembre (R. Baeta, N. Issa, L. Sallé).

Les premières observations pour l'Indre-et-Loire ont sans surprise été réalisées au C.E.T. de Sonzay. Elles concernent trois immatures qui se sont succédé durant les mois de novembre et décembre sur le site.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (9/9 – 9/9)

Espèce polytypique nichant dans le nord-ouest de l'Europe, de l'Islande à la Mer Blanche, au sud jusqu'à l'ouest de la France et au Pays Basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la partie nord, en Scandinavie et au sud de la Baltique et argenteus de l'Europe occidentale à l'Islande.

Homologable en dehors de l'Indre-et-Loire.

Loiret - Saint-Benoît-sur-Loire/L'Ile aux Cânes, ad., ssp *argenteus*, phot., 07 janvier (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/ C.E.T., 2^{ème} hiver, phot., 26 au 29 janvier (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 26 janvier au 23 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 2^{ème} hiver, phot., 26 janvier au 23 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 3^{ème} hiver, phot., 26 janvier au 23 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 26 janvier au 19 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 29 janvier (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 07 février (J. Thurel) ; Bou/La Petite Levée, 2^{ème} hiver, phot., 18 février (J. Thurel, A. Renner).

Belle série d'observations dans le Loiret dont l'écrasante majorité provient de la décharge de Saint-Lyé-La-Forêt, régulièrement suivie par un observateur attentif.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (9/9 – 15/14)

Niche de la Mer Noire à l'Est du Kazakhstan et en petit nombre dans la région de Moscou en Russie, ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hiverné dans le Golfe Persique, en Mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe.

Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 2^{ème} hiver, phot., 02 janvier au 13 février (N. Issa) même individu qu'à Saint-Lyé-la-Forêt, Loiret, du 11 au 18 décembre 2006 ; Sonzay/C.E.T., ad., phot., 02 au 19 janvier (N. Issa, J. Présent) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 08 janvier (N. Issa, A. Liger, J. Présent) ; Sonzay/C.E.T., 4^{ème} hiver, 10 janvier (N. Issa, L. Sallé) ; Sonzay/C.E.T., ad., phot., 13 au 21 février (N. Issa) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver., 13 février (N. Issa, L. Sallé) ; Villandry et La-Chapelle-aux-Naux/Loire, ad., phot., 04 novembre (N. Issa, E. Sansault *et al.*) ; Sonzay/C.E.T., 3^{ème} hiver, 15 novembre (N. Issa, L. Sallé) ; Sonzay/C.E.T., 4^{ème} hiver, phot., 22 au 24 novembre (R. Baeta, N. Issa, L. Sallé, A. Liger) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 22 novembre au 01 décembre (R. Baeta, N. Issa, L. Sallé) ; Sonzay/C.E.T. et Rillé/Lac, 1^{er} hiver, phot., 24 novembre au 04 décembre (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, L. & D. Sallé) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, phot., 24 novembre (J. Présent) ;

Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, 01 décembre (L. & D. Sallé, B. Delahaie, M. Delagarde *et al.*) ; Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, 06 et 07 décembre (N. Issa) ; La Riche/La Potetterie, ad., phot., 22 décembre (N. Issa).

Année record avec 15 individus, notés dans leur intégralité en Touraine. A signaler l'observation d'un immature en janvier-février, ayant préalablement été contacté dans le Loiret fin 2006. L'accumulation des observations au fil des ans permet de mieux appréhender le statut de l'espèce en Région Centre, son évolution ainsi que le rôle qu'occupe le Val de Loire dans le pattern national de l'espèce.



Fig. 18 : Goéland pontique *Larus cachinnans*, 2^{ème} hiver, en compagnie de Goélands bruns *Larus fuscus* de type hollandais « Dutch Type », Sonzay (37) - 02 janvier 2007 (N. Issa). Cet oiseau avait été observé quelques semaines plus tôt à Saint-Lyé-la-Forêt dans le Loiret, confirmant le rôle du Val de Loire comme axe migratoire pour cette espèce.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (0/0 – 3/4)

Dans le Paléarctique, niche autour de l'Atlantique Nord du Portugal aux archipels arctiques. Migrateur commun le long des côtes, d'apparition occasionnelle à l'intérieur des terres, souvent suite aux tempêtes atlantiques.

Indre-et-Loire - Assay/Etang, 2 ad., phot., 04 au 11 mars (M. Cohidon *et al.*) ; Le Louroux/Etang, ad. trouvée morte, 28 mars (J. Présent).

Loiret - Trainou/F.D. d'Orléans, trouvée morte, printemps (J. Thurel, Y. Kayser).

Premières observations régionales depuis 2004. L'apparition de l'espèce est en général liée aux forts vents d'ouest, d'où la prépondérance des données sur la façade occidentale. Dans le Loiret, les restes d'un oiseau ont été déterminés dans une pelote d'Aigle botté.



Fig. 19 : Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*, adulte, Assay (37) - mars 2007 (M. Cohidon).



Fig. 20 : Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*, adulte, Assay (37) - mars 2007 (M. Cohidon).

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (5/8 – 1/1)

Dans le Paléarctique, niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverne en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun à rare en France, essentiellement le long des côtes atlantiques et méditerranéennes.

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad., 10 septembre (P. Cabard, J.-M. Thibault).

Après le record de 8 oiseaux en 2006, une seule observation a été réalisée dans un département où l'espèce est semble-t-il annuelle.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (4/9 – 2/2)

Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie Orientale (région de l'Amour). Hiverne principalement en Afrique tropicale.

Cher- Sancoins/Etang de Javoulet, ad., 21 avril (J.-M. Chartendrault, A. Liger, F. Besson).

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, juv., 28 août (J. Présent, G. Sabatier, D. Sallé).

Les observations sont annuelles mais l'espèce demeure très rare à l'échelle régionale.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (1/7 – 1/3)

La sous-espèce nominale se reproduit de la France (au sud de la Loire) à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie.

Loir-et-Cher - Sassay/Le Clouseau, un couple avec 3 jeunes et deux chanteurs, phot., 30 juin au 01 août (F. Pelsy, D. Hémary).

Au moins un couple s'est à nouveau reproduit sur le même site qu'en 2006 dans le Loir-et-Cher. L'espèce est probablement à rechercher dans ses bastions autrefois occupés.



Fig. 21 : Petit-duc scops *Otus scops*, Sassay (41) - été 2007 (F. Pelsy).

GRAND-DUC D'EUROPE *Bubo bubo* (1/1 – 1/1)

La sous-espèce nominale se reproduit des Pyrénées jusqu'à 45° de longitude Est.

Indre - Mérigny, 28 novembre (P. Boyer).

La découverte de pelotes appartenant à cette espèce indique la présence d'un individu dans la vallée de l'Anglin sans que l'oiseau ait pu être localisé.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (9/9 – 8/84)

En Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes latitudes des zones tempérées, boréales et arctiques. Migrateur à migrateur partiel, les populations du nord de l'Europe et de Russie hivernent en Europe Occidentale et Orientale, au sud jusqu'en Afrique du Nord et au Proche-Orient.

Eure-et-Loir - Ymonville, 45 ind., phot., 22 décembre (T. & C. Cense); Péronville, 5 ind., phot., 29 et 30 décembre (T. & C. Cense).

Indre-et-Loire - Chédigny/La Champeigne, 7 ind., phot., 20 décembre (N. Issa, M. Delagarde, E. Sansault).

Loiret - Intville-la-Guétard/Chemin de St-Mathurin, 11 ind. 21 novembre (C. Lartigau); Ruan/Bassin de Ruan, 7 ind., 28 décembre au 19 janvier 2008 (M. Lacroix & F. Trigodet); Vrigny/F.D. d'Orléans, trouvé mort, printemps (J. Thurel, Y. Kayser).

Loir-et-Cher - Averdon/Les Tresseaux, 6 ind. max., jusqu'au 04 décembre au moins (A. Pollet); Ouzouer/Le Doyen, 2 ind. phot., 29 décembre (T. & C. Cense).

La fin de l'année est marquée par un début d'afflux qui se prolongera durant tout l'hiver et s'étendra à l'ensemble de la région. Des groupes parfois importants sont ainsi notés, notamment dans l'Eure-et-Loir. Dans le Loiret, les restes d'un oiseau ont été déterminés dans une pelote d'Autour des palombes.

PIC CENDRE *Picus canus* (8/8 – 4/4)

Sédentaire. Niche en moyennes latitudes, dans les forêts des zones tempérées et boréales d'Europe et de Russie, à l'est jusqu'aux monts de l'Altai et au fleuve Baïkal.

Indre-et-Loire - Loches/Forêt, mâle ad., 21 et 28 janvier (A. & P. Levêque); Chemillé-sur-Indrois/Vente à Canon, fem. ad., 03 mars (J. Présent, L. Le Gal).

Loiret - Montereau/Romeux, mâle ad., 29 avril (C. Lartigau); Ingrannes/F.D. d'Orléans, mâle ad., 15 juillet (J. Thurel, A. Larousse).

Les quelques données parvenues cette année montrent la persistance de l'espèce dans un certain nombre de massifs forestiers et bien que son statut semble assez précaire.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (4/5 – 1/1)

Niche en milieu sec, dans les basses et moyennes latitudes des zones tempérées, steppiques et méditerranéennes du sud de l'Europe, d'Afrique du Nord, du Proche-Orient et de la Russie au nord de la Mer Noire. Hivernent en Afrique au sud du Sahara.

Loiret - Villeneuve-sur-Conie, mâle chanteur, 15 mai et 03 juin (C. Lartigau, S. Branchereau, GOLNE).

Un chanteur est à nouveau contacté sur la commune de Villeneuve-sur-Conie qui figure parmi les derniers sites de nidification de l'espèce à l'échelle régionale.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (4/5 – 1/2)

Niche dans le Paléarctique Occidental, au niveau des basses et moyennes latitudes, dans les zones tempérées, steppiques et méditerranéennes. La sous-espèce nominale hiverne dans les zones du Sahel au sud du Sahara.

Loiret - Coinces-le-Buisson, 2 ad., 25 août (C. Lartigau & S. Branchereau).

Les deux oiseaux notés en août s'inscrivent dans le passage postnuptial classique de cette espèce en France.

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (0/0 – 1/1)

Espèce polytypique. A. p. petrosus, sédentaire, niche sur les côtes d'Europe Occidentale et A. p. littoralis, migrateur, niche en Scandinavie et dans le nord de la Russie. Les observations sont occasionnelles à l'intérieur des terres.

Loiret - Saint-Benoît-sur-Loire/Ile des Mahis, ssp, 23 décembre (C. Lartigau).

L'appartenance subsécifique de cet individu n'a pas pu être attribuée bien qu'il s'agisse probablement de littoralis, nicheur d'Europe du Nord et hivernant en Europe Occidentale. L'apparition de la sous-espèce petrosus est plutôt improbable étant donné son caractère hautement sédentaire à l'intérieur des terres.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* (10/216 – 0/0)

La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'afflux liés à la fructification des arbres à baies dans le nord de l'Europe, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux et l'ensemble de l'Europe Centrale.

2005 - Cher - Morogues, 12 ind., phot., 03 mars (Fide P. Derrien).

Suite à l'observation parvenue tardivement de 12 individus dans le Cher, le total régional comptabilisé lors de l'afflux de 2005 s'élève à 216 oiseaux.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (16/23 – 4/4)

Niche sur une large zone du Paléarctique d'étendant de l'Ouest de l'Europe à la Sibérie orientale et de l'Asie Centrale à la Turquie pour sa limite Sud. Hiverné en Afrique sub-saharienne, en Afrique du Nord, dans la Péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Indre-et-Loire - Saint-Genouph/Ile aux Bœufs, 25 mars (J. Présent) ; Parçay-sur-Vienne/Château de Prézault, fem. ad., 27 mars (N. Issa) ; Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, 21 août (J. Présent).

Loir-et-Cher - Chémery/Etang du Gué, mâle ad., phot., 03 août (A. Pollet).

Retour à une année normale après l'euphorie de 2006 et ses 20 oiseaux comptabilisés. Les dates d'observations cadrent parfaitement au pattern de passage connu de l'espèce.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus* (14/18 – 9/14)

*La sous-espèce nominale niche en Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Irlande et la sous-espèce *alpestris* dans les montagnes du centre et du sud de l'Europe. Hiverné le long du Bassin Méditerranéen, dans la Péninsule Ibérique et en Afrique du Nord, à l'est jusqu'au Moyen-Orient.*

Cher - Avord, 1 mâle et 2 fem., ad., phot., 15 avril (P. Derrien).

Eure-et-Loir - Courbehaye/Moronville, fem. ad., phot., 22 avril (T. Cense, A. Chauveau) ; Unverre/La Petite Bodardière, 2 ind. dont un mâle, phot., 22 et 23 avril (E. Montocchio).

Indre - Rosnay, mâle ad., 15 avril (T. Williams).

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, 2 mâles et 1 fem., ad., 08 avril (J. Présent, A. Liger, E. Sansault) ; Rillé, mâle ad., phot., 11 avril (S. Reverdiau) ; Semblançay/Le Carroi Mêlier, mâle ad., 11 avril (J. Présent) ; Channay-sur-Lathan/La Grande maison, fem. ad., 15 avril (Y. Guenescheau, D. Poteau) ; Luzillé/La Fosse Maure, mâle ad., phot., 21 septembre (J. Présent, L. Le Gal).

2006

Indre-et-Loire - Semblançay/Le Carroi Mêlier, 2 ind., 17 octobre (J. Présent).

Le nombre d'individus est comparable à 2006. Les observations sont en majorité notées au printemps lors de la première quinzaine d'avril. Le passage automnal semble être passé inaperçu cette année.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (5/5 – 1/5)

Niche depuis les rives de la Mer Méditerranée (Afrique du Nord et l'Europe méridionale) jusqu'aux Mers du Nord et Baltique, atteint le sud de la Scandinavie, et s'étend à l'est jusqu'à Iénisseï en Russie.

Cher - Bengy-sur-Craon/Etang, 5 chanteurs, phot., 28 avril au 24 juin (P. Derrien, F. Besson, J.-M. Chartendault, S. Merle).

L'implantation d'une micro-population dans le Cher est encourageante et contraste avec le statut observé ailleurs en région Centre, notamment en Brenne où les effectifs se sont effondrés au fil des ans.



Fig. 22 : Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*, Avord (18) - mai 2007 (P. Derrien).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (0/0 – 1/1)

Niche en Sibérie et hiverne dans le sud et le sud-est de l'Asie. Migrateur rare mais régulier en Europe en septembre-octobre. Occasionnel à l'intérieur des terres.

Indre-et-Loire - Tours/Lac de la Bergeronnerie, 19 octobre (J. Présent *et al.*).

Deuxième mention pour la région Centre et l'Indre-et-Loire après celle d'un individu le 22 février 1997 à Yzeures-sur-Creuse. Cette observation intervient dans le contexte d'un passage continental marqué à l'échelle nationale.

MESANGE BOREALE *Parus montanus* (16/27 – 1/1)

Large distribution s'étendant de la moitié est de la France, comprenant une grande partie de l'Europe Centrale et du Nord, l'Angleterre, la Fennoscandie, à l'est jusqu'à la Sibérie.

Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault/Etang des Gâts, 19 décembre (F. Pelsy).

Bien que nettement sous notée, l'unique observation reflète le statut de cette espèce qui s'est fortement dégradé à l'échelle régionale.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (2/5 – 1/1)

La sous-espèce type se reproduit à travers l'Europe, de la péninsule Ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc-Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.

Indre-et-Loire - Parçay-sur-Vienne/Prézault, fem. ad., phot., 07 avril (J. Présent, A. Liger).

Après les 5 individus notés en 2006, retour à une année normale avec un seul individu, observé classiquement au printemps.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (11/11 – 7/7)

Espèce polytypique dont la sous-espèce nominale niche sur un large front du centre de la France, au nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Iénisseï.

Cher - Jouet-sur-l'Aubois/D12 entre La Gavroche et La Boucharderie, ad., 05 janvier (S. Merle).

Loiret - Ingrannes/Château de Centimaison, +1A, phot., 07 janvier au 22 janvier (J. Thurel) ; Jouy-le-Potier/La Touche, phot., 14 janvier au 03 février (G. & P. Chevrier, J. Dumont) ; F.D. d'Orléans/Massif d'Ingrannes, ad., 06 novembre au 14 mars 2008 (J. Thurel) ; F.D. d'Orléans/Massif d'Ingrannes, ad., phot., 06 novembre au 12 février 2008 (J. Thurel) ; F.D. d'Orléans/Massif des Lorris, ad., 12 décembre (J. Thurel).

Loir-et-Cher - Souesmes/La Remondière, ad., 07 novembre (M. Mabileau).

Cette année confirme à nouveau l'importance des parcelles en régénération de la Forêt Domaniale d'Orléans pour l'hivernage de l'espèce à l'échelle régionale.



Fig. 23 : Pie-grièche grise *Lanius excubitor*, Jouy-le-Potier (45) - janvier 2007 (J. Dumont).

GRAND CORBEAU *Corvus corax* (0/0 – 1/2)

Nicheur sédentaire en France dans la moitié sud ainsi qu'en Bretagne. En région Centre, un ou plusieurs couples semblent installés dans la vallée de la Creuse.

Indre - Cuzion, 2 ind., 29 novembre (T. Chatton, J. Eldin).

Deux individus sont contactés dans la vallée de la Creuse où semblent résider plusieurs couples.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (1/1 – 2/2)

Nicheur arctique se reproduisant sur les plateaux rocheux de la toundra à proximité de zones enneigées et sur les côtes et falaises rocailleuses du littoral. Hiverné le long des côtes d'Europe Occidentale du Danemark à la façade atlantique française et en Grande Bretagne, ainsi qu'en Europe Orientale, dans les plaines de Hongrie et de Roumanie.

Cher - Brécy/Les Grelus, mâle ad., 29 novembre (P. Derrien).

Indre-et-Loire - Vernou-sur-Brenne/La Pièce des Pommiers, mâle ad., phot., 16 au 18 décembre (J. Présent *et al.*).

Migrateur côtier, l'occurrence de l'espèce à l'intérieur des terres est occasionnelle. L'espèce peut alors être observée dans un large éventail de milieu ouvert et en compagnie d'autres espèces (alouettes, fringilles).

ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

2007

Goéland marin *Larus marinus* - Indre-et-Loire - Saint-Genouph/La Gaudinière, 1^{er} hiver, 19 janvier (*probablement cette espèce mais absence de description de critères déterminants, notamment les couvertures et les tertiaires, permettant d'exclure un gros mâle de Goéland leucophée*).

Goéland pontique *Larus cachinnans* - Indre-et-Loire - Saint-Genouph/La Gaudinière, subadulte, 19 janvier (*Description insuffisante pour une espèce d'identification délicate*).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* - Eure-et-Loir - Mainvilliers/ZA du Vallier, chanteur, 09 juin (*Chant pouvant correspondre à cette espèce mais également à une Rousserolle effarvate douée. En l'absence de critères visuels, l'attribution de ce chanteur à l'une ou l'autre de ces espèces n'a pu être effectuée*).

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE D'HOMOLOGATION NATIONAL ENTRE 2000 ET 2007

GREBE A BEC BIGARRE *Podilymbus podiceps*

2001 - Indre - Lingé, phot., 7 avril au 6 mai (C. Couartou, F. Desage, C. Mercier, J. Sudreau).

OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

2005 - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad., phot., 14 au 28 février (N. Issa, A. Liger, J. Présent *et al.*).

2002 - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 1^{er} hiver, phot., 13 décembre au 27 janvier 2003 (J.-M. Thibault, T. Girard, N. Issa *et al.*).

BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis*

2001 - Loir-et-Cher - Soings-en-Sologne, ad., vidéo, 21 février (F. Pelsy, A. Perthuis).

SARCELLE A AILES BLEUES *Anas discor*

2003 - Cher - La Celle-Condé, mâle ad., 04 mai (J.-M. et V. Chartendault).

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris*

2004 - Cher - Précly, mâle ad., phot., 23 au 28 février (P. Derrien *et al.*).

2003 - Indre - Lingé, fem. ad., 31 décembre au moins (F. Desage).

2002 - Indre - Lingé, fem. ad., 26 novembre au 15 décembre (F. et L. Desage, C. Mercier).

2000 - Indre - Lingé et Rosnay, m. ad., 26 décembre au 11 mars 2001 (A. Audevard & *al.*).

FULIGULE A TETE NOIRE *Aythya affinis*

2007 - Indre - Lingé/La Gabrière, mâle ad., phot., 06 mars au 16 avril (C. Mercier, J. Vèque *et al.*).

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*

2002 - Indre - Lingé/La Gabrière, mâle, éliminé, 7 mai (J. Deberge) ; Lingé/Lérignon, fem., 23 décembre (LPO Cher).

2001 - Indre - Lingé/Les Vignaux, fem. ad. et 2 imm., 29 novembre (A. Audevard).

ELANION BLANC *Elanus caeruleus*

2001 - Indre - Mézières-en-Brenne, ad., phot., 19 décembre au 3 février 2002 (R. Baeta, J.-J. Courthial, N. Issa *et al.*).

AIGLE CRIARD *Aquila clanga*

2004 - Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, subad., phot., 28 novembre au 22 décembre (D. Auclair, A. Trompat *et al.*).

2004 - Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault, imm., 6 mars (M. Mabilieu).

BUSARD PALE *Circus macrourus*

2007 - Cher - Uzay-le-Venon, mâle ad., 03 avril (J.-M. Chartendault) ; Montigny, mâle ad., 07 avril (M. Villemagne, C. Briand *et al.*).

2005 - Indre-et-Loire - Reignac-sur-Indre, mâle ad., 31 mars (A. Liger, J. Présent).

BUSE FEROCHE *Buteo rufinus*

2007 - Eure-et-Loir - Neuvy-en-Beauce, ad., 13 septembre (C. Lartigau).

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

2005 - Indre - Mézières-en-Brenne, fem. ad., 6 janvier au 5 février (R. Bussière, E. & M. Holtof).

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva*

2005 - Indre - Vendœuvres/Etang du Grand Brun, 2 ind., phot., 12 juin au 02 juillet (M. Jamier, J. Deberge, S. Mortreux, J. Trotignon) ; Saint-Michel-en-Brenne/Etang des Essarts, juv., 23 juillet (J. Trotignon).

2005 - Indre-et-Loire - Le Louroux, fem. ad., phot., 3 au 13 avril (N. Cailleret, A. Liger, J. Thurel *et al.*).

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla*

2005 - Indre - Vendœuvres/Etang du Grand Brun, 12 juin au 02 juillet (M. Jamier, J. Deberge, S. Mortreux, J. Trotignon).

VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria*

2004 - Cher - Bengy-sur-Craon, 1^{er} hiver, phot., 13 novembre (J.-M. Chartendault, A. Liger).

2004 - Eure-et-Loir - Cloyes-sur-le-Loir, 1^{er} hiver, 31 octobre (J. Présent).

2004 - Indre - Mézières-en-Brenne, ad., phot., 22 mai au 6 juillet (P.-J. Dubois, C. Kérihuel, J. Présent, A. Virondeau *et al.*).

2001 - Indre - Chabris, ad., phot., vidéo, 2 au 13 avril (F. Pelsy, A. Perthuis).

PLUVIER BRONZE *Pluvialis dominica*

2001 - Loir-et-Cher - Chémery/Etang de l'Arche, phot., 12 au 15 octobre (F. Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet).

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva*

2000 - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., 11 septembre (R. Baeta, N. Issa).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

2005 - Eure-et-Loir - Saumeray, juv., phot., 24 septembre (T. Cense).

2004 - Loiret - Saint-Denis-en-Val, phot., 7 au 15 avril (S. Branchereau, B. Delahaie *et al.*).

BECASSINE DOUBLE *Gallinago media*

2005 - Cher - Vierzon/Sablière du Bois Blanc, ad., 6 juin (A. Liger, J. Présent *et al.*).

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea*

2004 - Indre - Mézières-en-Brenne - 1^{er} été, phot., 21 au 23 mai (P.-J. Dubois, A. Virondeau *et al.*).

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*

2005 - Indre-et-Loire - La-Chapelle-aux-Naux, juv., 28 août (M. Delagarde, R. Baeta, J. Présent).

GOELAND D'AMERIQUE *Larus smithsonianus*

2006 - Indre-et-Loire - Sonzay, 1^{er} hiver, phot., 08 au 11 mars (R. Baeta, A. Liger, J. Présent).

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*

2001 - Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps, 9 octobre (L. Le Gal).

REMERCIEMENTS

Le CHR Centre tient à remercier chaleureusement ceux qui au cours de l'année 2007, ont contribué à son bon fonctionnement :

- Nature Centre pour le soutien logistique et de communication qu'elle apporte au secrétariat du Comité.
- Les Organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Berry Nature Environnement, SEPANT, Réserve de Chérine, LPO Brenne, LPO Cher, LPO Loiret, LPO Touraine, SNE, Perche Nature, SAMNEL, Nature 18, Loiret Nature Environnement, Loir-et-Cher Nature, Indre Nature, Eure-et-Loir Nature, Sologne Nature Environnement, CPIE Touraine Val de Loire, APSL.
- L'ensemble des ornithologues, naturalistes, dessinateurs et photographes sans qui le CHR Centre ne fonctionnerait pas.



Fig. 24 : Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*, juvénile, Le Louroux (37) - 13 novembre 2007 (E. Sansault)

BIBLIOGRAPHIE

- COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE, 2007** - Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : 234-246.
- DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008** - *Nouvel Inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris.
- FREMONT J.-Y., REEBER S. & le CHN, 2007** - Les oiseaux rares en France en 2005. 24^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 14 (5) : 265-307.
- FREMONT J.-Y., DUQUET M. & le CHN, 2006** - Les oiseaux rares en France en 2004. 23^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 13 (2) : 73-113.
- FREMONT J.-Y. & le CHN, 2005** - Les oiseaux rares en France en 2003. 22^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 12 (1) : 2-45.
- FREMONT J.-Y. & le CHN, 2004** - Les oiseaux rares en France en 2002. 21^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 11 (2) : 49-85.
- FREMONT J.-Y. & le CHN, 2003** - Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 10 (2) : 49-83.
- FREMONT J.-Y. & le CHN, 2002** - Les oiseaux rares en France en 2000. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 9 (1) : 2-33.
- MARTIN R. & ROLLINAT R., 1894** - *Vertébrés sauvages du département de l'Indre*. Société d'éditions scientifiques. Paris.
- REEBER S., FREMONT J.-Y., FLITTI A. & le CHN, 2008** - Les oiseaux rares en France en 2006-2007. 25^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 15 (5) : 313-355.
- ZUCCA M. & le CMR, 2007** - Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 3^{ème} rapport du CMR (janv. 2003 - déc. 2004). *Ornithos* 14 (1) : 2-33.

ZUCCA M. & le CMR, 2005 - Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^{ème} rapport du CMR (janv. 2001 - déc. 2002). *Ornithos* 12 (5) : 233-260.

ZUCCA M. & le CMR, 2004 - Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 1^{er} rapport du CMR (juillet 2000 - juin 2001). *Ornithos* 11 (5) : 193-213.

CHR Centre - Liste des espèces à homologuer

<u>Plongeon catmarin</u> <i>Gavia stelleta</i>	<u>Sterne hansel</u> <i>Gelochelidon nilotica</i>
<u>Plongeon arctique</u> <i>Gavia arctica</i>	<u>Sterne caspienne</u> <i>Sterna caspia</i>
<u>Plongeon imbrin</u> <i>Gavia immer</i>	<u>Sterne caugek</u> <i>Sterna sandvicensis</i>
<u>Grèbe jougris</u> <i>Podiceps grisegena</i>	<u>Sterne de Dougall</u> <i>Sterna dougallii</i>
<u>Grèbe esclavon</u> <i>Podiceps auritus</i>	<u>Sterne arctique</u> <i>Sterna paradisaea</i>
<u>Puffin des Anglais</u> <i>Puffinus puffinus</i>	<u>Guifette leucoptère</u> <i>Chlidonias leucopterus</i>
<u>Océanite tempête</u> <i>Hydrobates pelagicus</i>	<u>Pingouin torda</u> <i>Alca torda</i>
<u>Océanite cul-blanc</u> <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	<u>Coucou-geai</u> <i>Clamator glandarius</i>
<u>Fou de Bassan</u> <i>Morus bassanus</i>	<u>Grand-duc d'Europe</u> <i>Bubo bubo</i>
<u>Cormoran huppé</u> <i>Phalacrocorax huppé</i>	<u>Petit-duc scops</u> <i>Otus scops</i>
<u>Butor étoilé</u> <i>Botaurus stellaris</i> (hors Indre)	<u>Hibou des marais</u> <i>Asio flammeus</i>
<u>Blongios nain</u> <i>Ixobrychus minutus</i> (hors Indre)	<u>Martinet à ventre blanc</u> <i>Apus melba</i>
<u>Crabier chevelu</u> <i>Ardeola ralloides</i>	<u>Rollier d'Europe</u> <i>Coracias garrulus</i>
<u>Ibis falcinelle</u> <i>Plegadis falcinellus</i>	<u>Pic cendré</u> <i>Picus canus</i>
<u>Spatule blanche</u> <i>Platalea leucorodia</i>	<u>Alouette calandre</u> <i>Melanocorypha calandra</i>
<u>Flamant rose</u> <i>Phoenicopterus ruber</i>	<u>Alouette calandrelle</u> <i>Calendrella brachydactyla</i>
<u>Cygne de Bewick</u> <i>Cygnus columbianus</i>	<u>Alouette haussecol</u> <i>Eremophila alpestris</i>
<u>Cygne chanteur</u> <i>Cygnus cygnus</i>	<u>Hirondelle des rochers</u> <i>Ptyonoprogne rupestris</i>
<u>Oie des moissons</u> <i>Anser fabalis</i> (hors Craon, Cher)	<u>Hirondelle rousseline</u> <i>Hirundo daurica</i>
<u>Oie rieuse</u> <i>Anser albifrons</i>	<u>Pipit de Richard</u> <i>Anthus richardi</i>
<u>Bernache nonnette</u> <i>Branta leucopsis</i>	<u>Pipit rousseline</u> <i>Anthus campestris</i>
<u>Bernache cravant</u> <i>Branta bernicla</i>	<u>Pipit à gorge rousse</u> <i>Anthus cervinus</i>
<u>Nette rousse</u> <i>Netta rufina</i> (hors Indre)	<u>Pipit maritime</u> <i>Anthus petrosus</i>
<u>Fuligule à bec cerclé</u> <i>Aythya collaris</i>	<u>Jaseur boréal</u> <i>Bombycilla garrulus</i>
<u>Fuligule nyroca</u> <i>Aythya nyroca</i>	<u>Cincle plongeur</u> <i>Cinclus cinclus</i>
<u>Fuligule milouinan</u> <i>Aythya marila</i>	<u>Accenteur alpin</u> <i>Prunella collaris</i>
<u>Harelde boréale</u> <i>Clangula hyemalis</i>	<u>Gorgebleue à miroir</u> <i>Luscinia svecica</i>
<u>Eider à duvet</u> <i>Somateria mollissima</i>	<u>Traquet oreillard</u> <i>Oenanthe hispanica</i>
<u>Macreuse noire</u> <i>Melanitta nigra</i>	<u>Monticole de roche</u> <i>Monticola saxatilis</i>
<u>Macreuse brune</u> <i>Melanitta fusca</i>	<u>Monticole bleu</u> <i>Monticola solitarius</i>
<u>Harle huppé</u> <i>Mergus serrator</i>	<u>Merle à plastron</u> <i>Turdus torquatus</i>
<u>Erismature rousse</u> <i>Oxyura jamaicensis</i>	<u>Locustelle luscinoïde</u> <i>Locustella luscinioides</i> (hors Indre)
<u>Pygargue à queue blanche</u> <i>Haliaeetus albicilla</i>	<u>Phragmite aquatique</u> <i>Acrocephalus paludicola</i>
<u>Percnoptère d'Egypte</u> <i>Neophron percnopterus</i>	<u>Rousserolle verderolle</u> <i>Acrocephalus palustris</i>
<u>Vautour fauve</u> <i>Gyps fulvus</i>	<u>Rousserolle turdoïde</u> <i>Acrocephalus arundinaceus</i>
<u>Vautour moine</u> <i>Aegypius monachus</i>	<u>Hypolaïs ictérine</u> <i>Hippolaïs icterina</i>
<u>Aigle royal</u> <i>Aquila chrysaetos</i>	<u>Fauvette passerinette</u> <i>Sylvia cantillans</i>
<u>Aigle de Bonelli</u> <i>Hieraetus fasciatus</i>	<u>Fauvette orphée</u> <i>Sylvia hortensis</i>
<u>Faucon kobez</u> <i>Falco vespertinus</i>	<u>Pouillot à grands sourcils</u> <i>Phylloscopus inornatus</i>
<u>Marouette ponctuée</u> <i>Porzana porzana</i>	<u>Pouillot véloce</u> <i>tristis</i> <i>Phylloscopus (collybita) tristis</i>
<u>Marouette poussin</u> <i>Porzana parva</i>	<u>Pouillot ibérique</u> <i>Phylloscopus brehmi</i>
<u>Huitrier pie</u> <i>Haematopus ostralegus</i>	<u>Gobemouche nain</u> <i>Ficedula parva</i>
<u>Glaréole à collier</u> <i>Glareola pratincola</i>	<u>Gobemouche à collier</u> <i>Ficedula albicollis</i>
<u>Pluvier guignard</u> <i>Charadrius morinellus</i>	<u>Mésange boréale</u> <i>Parus montanus</i>
<u>Gravelot à collier interrompu</u> <i>Charadrius alexandrinus</i>	<u>Panure à moustaches</u> <i>Panurus biarmicus</i>
<u>Bécasseau de Temminck</u> <i>Calidris temminckii</i>	<u>Rémiz penduline</u> <i>Remiz pendulinus</i>
<u>Bécasseau tacheté</u> <i>Calidris melanotos</i>	<u>Tichodrome échelette</u> <i>Tichodroma muraria</i>
<u>Bécasseau violet</u> <i>Calidris maritima</i>	<u>Pie-grièche à poitrine rose</u> <i>Lanius minor</i>
<u>Chevalier stagnatile</u> <i>Tringa stagnatilis</i>	<u>Pie-grièche grise</u> <i>Lanius excubitor</i>
<u>Barge rousse</u> <i>Limosa lapponica</i>	<u>Pie-grièche méridionale</u> <i>Lanius meridionalis</i>
<u>Courlis corlieu</u> <i>Numenius phaeopus</i>	<u>Cassenoix moucheté</u> <i>Nucifraga caryocatactes</i>
<u>Bécassine sourde</u> <i>Lymnocyptes minimus</i> (hors Indre-et-Loire)	<u>Chocard à bec jaune</u> <i>Pyrrhocorax graculus</i>
<u>Phalarope à bec large</u> <i>Phalaropus fulicarius</i>	<u>Crave à bec rouge</u> <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
<u>Phalarope à bec étroit</u> <i>Phalaropus lobatus</i>	<u>Corneille mantelée</u> <i>Corvus cornix</i>
<u>Labbe pomarin</u> <i>Stercorarius pomarinus</i>	<u>Grand Corbeau</u> <i>Corvus corax</i>
<u>Labbe parasite</u> <i>Stercorarius parasiticus</i>	<u>Moineau soulcie</u> <i>Petronia petronia</i>
<u>Labbe à longue queue</u> <i>Stercorarius longicaudus</i>	<u>Niverolle alpine</u> <i>Montifringilla nivalis</i>
<u>Grand Labbe</u> <i>Stercorarius skua</i>	<u>Linotte à bec jaune</u> <i>Carduelis flavirostris</i>
<u>Mouette de Sabine</u> <i>Larus sabini</i>	<u>Sizerin flammé</u> <i>Carduelis flammea</i>
<u>Goéland pontique</u> <i>Larus cachinnans</i>	<u>Bruant lapon</u> <i>Calcarius lapponicus</i>
<u>Goéland argenté</u> <i>Larus argentatus</i> (hors Indre-et-Loire)	<u>Bruant des neiges</u> <i>Plectrophenax nivalis</i>
<u>Goéland marin</u> <i>Larus marinus</i>	<u>Bruant fou</u> <i>Emberiza cia</i>
<u>Mouette tridactyle</u> <i>Rissa tridactyla</i>	<u>Bruant ortolan</u> <i>Emberiza hortulan</i>



COMITE D'HOMOLOGATION REGIONAL CENTRE

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Région Centre

A retourner à : Nidal ISSA, Secrétaire du CHR Centre, 16 rue Azay-le-Rideau, 37300 Joué-lès-Tours

Ou par email : nidalissa2002@yahoo.fr

ESPÈCE PROPOSÉE :

Nombre d'individus :

Sexe :

Age :

LOCALITÉ (Commune, Lieu-dit) :

Département :

DATE DE L'OBSERVATION :

Durée de l'obs. :

Dates d'observations du même oiseau :

RÉDACTEUR DE LA FICHE (nom et adresse) :

Tél./ e-mail :

AUTRES OBSERVATEURS :

Oiseau trouvé par :

Identifié par :

L'oiseau a-t-il été photographié, capturé, conservé ?

Par qui ?

Matériel optique utilisé :

Distance d'observation :

Conditions d'éclairage :

Connaissance antérieure de l'espèce :

Connaissance des espèces voisines :

Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) : indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...). Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.